

Толофитин

Регистрационный номер: ЛСР-004880/09

Торговое наименование: ТОЛОФИТИН

Международное непатентованное или группировочное наименование: Толокнянки обыкновенной листьев экстракт

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой

Состав на одну таблетку

Активного компонента

Толокнянки экстракта сухого - 0,050 г с содержанием суммы фенологликозидов в пересчете на арбутин и абсолютно сухое вещество не менее 25 %

Вспомогательных веществ ядра

[сахар молочный - до получения таблетки (лактоза), без оболочки крахмал картофельный, массой 0,2 г поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский (повидон), магния стеарат]

Вспомогательных веществ оболочки

[оксипропилметилцеллюлоза - до получения (гипромеллоза), макрогол 6000 таблетки, (полиэтиленгликоль 6000), покрытой краситель азарубин (кислотный оболочкой, красный 2С), титана двуокись массой 0,222 г пигментная (титана диоксид)]

Описание

Таблетки двояковыпуклой формы, покрытые оболочкой, темно-красного цвета с фиолетовым оттенком.

Фармакотерапевтическая группа:

Диуретическое средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие

Оказывает противовоспалительное, диуретическое, антисептическое действие.

Показания к применению

В комплексной терапии воспалительных заболеваний мочевого пузыря и мочевыводящих путей (цистит, уретрит).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату. Острая почечная недостаточность, острый гломерулонефрит. Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Беременность, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности противопоказано. Применение в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способы применения и дозы

Внутрь, по 1-2 таблетке 3 раза в день после еды. Продолжительность курса 7-14 дней. Повторный курс — через 3 месяца по рекомендации врача.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея; окрашивание мочи в темно-зеленый цвет.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При приеме больших доз препаратов толокнянки или при их длительном применении может наблюдаться обострение воспалительных заболеваний почек в результате длительного раздражения почечных канальцев.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 7 дней, следует сообщить об этом лечащему врачу

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

1 или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Адрес местонахождения: 142279, Московская обл., Серпуховский район, рабочий пос. Оболенск, ГНЦ ПМ. Тел./факс: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Адрес места осуществления производства: 142279, Московская обл., Серпуховский муниципальный район, городское поселение Оболенск, район рабочего поселка Оболенск, шоссе Оболенское, стр. 20.