

Листок-вкладыш – информация для пациента

Иммунотрезан, 200 мг, таблетки

Действующее вещество: оксиэтиламмония метилфеноксиацетат

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Иммунотрезан и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Иммунотрезан.
3. Прием препарата Иммунотрезан.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Иммунотрезан.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Иммунотрезан и для чего его применяют

Препарат Иммунотрезан содержит действующее вещество оксиэтиламмония метилфеноксиацетат и относится к группе «общетонизирующие средства». Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат обладает иммуностимулирующим действием с выраженными адаптогенными свойствами.

Показания к применению

- Препарат Иммунотрезан применяется у взрослых и детей от 12 лет в составе комплексной терапии:
- при профилактике и лечении острых респираторных вирусных инфекций;
 - в период высоких интеллектуальных и тяжелых физических нагрузок;
 - для повышения устойчивости организма к различным стрессовым воздействиям (гипоксия, перегревание, переохлаждение) и неблагоприятным воздействиям окружающей среды (резкая смена климатических условий, адаптация к перепадам атмосферного давления).

Способ действия препарата Иммунотрезан

Препарат Иммунотрезан укрепляет иммунную систему организма, повышает выносливость при физических и умственных нагрузках, уменьшает действие различных токсинов, повышает устойчивость организма к гипоксии, низким и высоким температурам и другим неблагоприятным факторам окружающей среды.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 3 дня, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Иммунотрезан

Противопоказания

Не принимайте препарат Иммунотрезан:

- если у Вас аллергия на оксиэтиламмония метилфеноксиацетат или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Иммунотрезан проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Сообщите Вашему лечащему врачу или работнику аптеки, если у Вас:

- сахарный диабет.

В случае острой респираторной вирусной инфекции, если у Вас наблюдаются перечисленные ниже признаки, то они, как правило, свидетельствуют о более тяжелом состоянии и Вам необходимо обратиться к врачу:

- повышение температуры тела выше 39 °С;
- повышение температуры сопровождается сильной болью, одышкой, нарушением сознания, судорогами;
- при симптомах острого респираторного заболевания температура тела выше 38,5 °С отмечается в течение 3 дней и более;
- температура выше 37,5 °С держится 2 недели и более.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 12 лет. Безопасность и эффективность препарата Иммунотрезан у детей в возрасте от 0 до 12 лет не установлены.

Другие препараты и препарат Иммунотрезан

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие лекарственные препараты.

Нежелательного взаимодействия с другими лекарственными препаратами не описано.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Данные о применении оксиэтиламмония метилфеноксиацетата у беременных женщин отсутствуют. Не принимайте препарат Иммунотрезан во время беременности.

Период грудного вскармливания

Данные о проникновении оксиэтиламмония метилфеноксиацетата в грудное молоко человека отсутствуют. Не принимайте препарат Иммунотрезан в период кормления грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Иммунотрезан не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Препарат Иммунотрезан содержит лактозу

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

3. Прием препарата Иммунотрезан

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

- для профилактики острых респираторных вирусных инфекций в составе комплексной терапии: принимайте по 1 таблетке (200 мг) в сутки после еды;
- для лечения острых респираторных вирусных инфекций в составе комплексной терапии: принимайте в первый день по 1 таблетке 3 раза (600 мг) в сутки, в последующие 7 дней по 1 таблетке (200 мг);
- в период высоких интеллектуальных и тяжелых физических нагрузок в составе комплексной терапии: принимайте в первый день 3 таблетки (600 мг) в сутки, в последующие 7 дней по 1 таблетке (200 мг);
- для повышения устойчивости организма к различным стрессовым воздействиям (гипоксия, перегревание, переохлаждение) и неблагоприятным воздействиям окружающей среды (резкая смена климатических условий, адаптация к перепадам атмосферного давления) в составе комплексной терапии: принимайте в первый день 3 таблетки (600 мг) в сутки, в последующие 7 дней по 1 таблетке (200 мг).

Применение у детей и подростков

Рекомендуемая доза для детей от 12 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

Путь и/или способ введения

Принимайте таблетки внутрь.

Риска предназначена лишь для разламывания с целью облегчения проглатывания, а не для разделения на равные дозы.

Продолжительность терапии

- для профилактики острых респираторных вирусных инфекций в составе комплексной терапии: всего на курс 14 таблеток (суммарная доза 2800 мг), длительность курса 14 дней;
- для лечения острых респираторных вирусных инфекций в составе комплексной терапии: всего на курс 10 таблеток (суммарная доза 2000 мг), длительность курса 8 дней;
- в период высоких интеллектуальных и тяжелых физических нагрузок в составе комплексной терапии: всего на курс 10 таблеток (суммарная доза 2000 мг), длительность курса 8 дней;
- для повышения устойчивости организма к различным стрессовым воздействиям (гипоксия, перегревание, переохлаждение) и неблагоприятным воздействиям окружающей среды (резкая смена климатических условий, адаптация к перепадам атмосферного давления) в составе комплексной терапии: всего на курс 10 таблеток (суммарная доза 2000 мг), длительность курса 8 дней.

Если Вы приняли препарата Иммунотрезан больше, чем следовало

Симптомы интоксикации вследствие передозировки препаратом не отмечены. Если Вы приняли препарата Иммунотрезан больше, чем следовало, обратитесь к врачу или в ближайший пункт скорой помощи.

Если Вы забыли принять препарат Иммунотрезан

Вы должны принимать препарат с частотой, назначенной Вам лечащим врачом, или как указано в листке-вкладыше, так как регулярность приема делает лечение более эффективным. Тем не менее, если Вы забыли принять препарат, следующую дозу примите в обычное время. Не принимайте двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропущенную.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Иммунотрезан может вызывать нежелательные реакции, однако, они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Иммунотрезан и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих признаков **аллергической реакции (гиперчувствительности)**:

- предобморочное состояние или потеря сознания, резкое снижение артериального давления, нарушение дыхания, бледно-синюшная, холодная, влажная кожа (анафилактический шок);
- свистящие хрипы, затруднение дыхания, крапивница, сыпь, зуд, отек лица, обморок – признаки острой аллергической реакции (анафилаксия);
- отек лица (губы, веки, щеки) и сллизистой рта, может распространяться на гортань, вызывая затруднение дыхания, охриплость голоса и лающий кашель (ангионевротический отек (отек Квинке)).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас при применении препарата Иммунотрезан возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о возникновении нежелательных реакций напрямую через систему сообщений

государств – членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@rosZdravnadZor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://WWW.rosZdravnadZor.gov.ru/>

5. Хранение препарата Иммунотрезан

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на контурной ячейковой упаковке и картонной упаковке (пачке).

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуетс. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Иммунотрезан содержит

Действующим веществом является оксиэтиламмония метилфеноксиацетат.

Каждая таблетка содержит 200 мг оксиэтиламмония метилфеноксиацетата.

Вспомогательными веществами являются: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, повидон K25, кальция стеарат.

Препарат Иммунотрезан содержит лактозу (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Иммунотрезан и содержимое упаковки

Таблетки.

Круглые плоскоцилиндрические таблетки от белого до белого с желтоватым или коричневатым оттенком цвета, со слабым характерным запахом или без запаха, с риской с одной стороны и фаской с двух сторон. Допускается мраморность. По 7 или 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной либо пленки поливинилхлоридной/поливинилиденхлоридной/поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

1 или 2 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению (листок-вкладыш) помещают в картонную упаковку (пачку).

Держатель регистрационного удостоверения

Россия

ООО «Атолл»

445351, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6.

Производитель

Россия

ООО «Озон»

Самарская обл., г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6.

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения

Россия

ООО «Озон»

445351, Самарская обл., г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6.

Тел.: +79874599991, +79874599992

E-mail: oZon@oZon-pharm.ru

Листок-вкладыш пересмотрен: -

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза <https://eec.eaeunion.org/>.