

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

СтрессОфф® форте

Регистрационный номер: ЛСР-000166/09 Торговое название препарата: СтрессОфф® форте

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой

Описание

Состав на одну таблетку.

Активного компонента Пассифлоры экстракта
сухого с содержанием суммы флавоноидов в
пересчёте на лютеолин-7-глюкозид и
абсолютно сухое вещество 4,5 %

-0,120 г

Вспомогательных веществ ядра [сахар
молочный (лактоза), крахмал картофельный,
магния карбонат основной (магния
гидроксикарбонат), поливинилпирролидон
низкомолекулярный медицинский (повидон),
магния стеарат]

- достаточное количество
до получения таблетки без
оболочки массой 0,3 г

Вспомогательных веществ оболочки

[оксипропилметилцеллюлоза (гипромеллоза),
полиэтиленгликоль 6000, краситель азорубин
(кислотный красный 2 С), титана двуокись
пигментная (титана диоксид)]

- достаточное количество
до получения таблетки
массой 0,318 г

Таблетки круглые двояковыпуклой формы с риской, покрытые оболочкой, тёмно-красного цвета с фиолетовым оттенком.

Фармакотерапевтическая группа

Седативное средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие

Оказывает седативное действие, снижает эмоциональную напряженность. Способствует восстановлению сна, нормализации ритмов сна, улучшению его качества. Снижает уровень тревожности, обладает антистрессорной и антиоксидантной активностью.

Показания к применению

В качестве мягкого седативного средства при бессоннице, нейро- циркуляторной дистонии, невротических реакциях, сопровождающихся повышенной раздражительностью, тревогой, страхом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, детский возраст до 18 лет.

Беременность и лактация

Не рекомендуется применять в период беременности и лактации в связи с отсутствием специальных исследований.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь по 1 таблетке 2 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения - 3-4 недели. Проведение повторного курса лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

При передозировке возможно возникновение угнетенного состояния, сонливости.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Возможно усиление действия снотворных, наркотических средств и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему, а также спазмолитиков.

Особые указания

Перед применением препарата рекомендуется проконсультироваться с врачом. При сохранении симптомов на фоне применения препарата в течение двух недель следует обратиться к врачу.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами, механизмами

В период приема препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой, 120 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку; по 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Адрес: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел/факс: +7 (495)716-15-81, 716-15-90.