

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Пантенол 3Д

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Пантенол 3Д

Международное непатентованное или группировочное наименование: декспантенол

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав на 100 г:

Действующее вещество:

Декспантенол - 5,0 г

Вспомогательные вещества:

вазелин - 25,0 г

ланолин - 15,0 г

парафин жидкий - 10,0 г

воск эмульсионный - 3,0 г

цетостеариловый спирт - 1,65 г

метилпарагидроксibenзоат - 0,2 г

вода очищенная - до 100,0 г

Описание

Однородная мазь светло-желтого цвета, возможны оттенки от желтовато-коричневого до зеленовато-коричневого цвета, с характерным запахом ланолина.

Фармакотерапевтическая группа: препараты для лечения ран и язв; препараты, способствующие нормальному рубцеванию; другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию.

Код АТХ: D03AX03

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Декспантенол — производное пантотеновой кислоты. Пантотеновая кислота — водорастворимый витамин группы В (витамин В5) — является составной частью кофермента А. Стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон. Повышение потребности в пантотеновой кислоте наблюдается при повреждении кожного покрова или тканей, а ее недостаток можно восполнить местным применением декспантенола.

Фармакокинетика

Абсорбция

При наружном применении быстро абсорбируется и превращается в пантотеновую кислоту.

Распределение

Связывается с белками плазмы крови (главным образом с бета-глобулином и альбумином). Концентрация пантотеновой кислоты в крови составляет 0,5 — 1 мг/л, в плазме крови — 100 мкг/л.

Биотрансформация

Пантотеновая кислота не подвергается в организме метаболизму.

Элиминация

Выводится в неизменном виде почками.

Показания к применению

Нарушения целостности кожного покрова, вызванные механическими, химическими, температурными факторами или после хирургических вмешательств:

- ожоги различного происхождения (в т.ч. солнечные);
- царапины, ссадины, раны, пролежни;
- плохо заживающие асептические послеоперационные раны;
- дерматиты, фурункулы, трофические язвы нижних конечностей;
- лечение и профилактика трещин и воспаления сосков молочной железы во время лактации;
- уход за детьми: профилактика и лечение опрелостей у грудных детей, активизация процесса заживления кожи при мелких повреждениях, пеленочный дерматит;
- для обработки и защиты сухой кожи;
- лечение и профилактика последствий неблагоприятного воздействия на кожу факторов внешней среды (холода, ветра, влажности).

Противопоказания

Гиперчувствительность к декспантенолу или к любому из вспомогательных веществ препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременность

Препарат Пантенол ЗД можно использовать во время беременности.

Лактация

Препарат Пантенол ЗД можно использовать в период грудного вскармливания.

Если препарат используется для обработки трещин во время лактации, он должен быть смыт перед кормлением грудью.

Способ применения и дозы

Наружно.

Мазь наносят тонким слоем на пораженный участок, слегка втирая, 2 – 4 раза в сутки (при необходимости чаще). В случае нанесения на инфицированную поверхность кожи, ее следует предварительно обработать любым антисептиком.

Кормящим матерям необходимо смазывать поверхность соска мазью после каждого кормления грудью.

Грудным детям наносят мазь после каждой смены белья или водной процедуры.

Длительность применения препарата зависит от индивидуальных особенностей течения заболевания у пациента и определяется достигнутым терапевтическим эффектом и переносимостью препарата.

Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие

Аллергические реакции, аллергические кожные реакции (например, контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, покраснение, экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи).

Передозировка

Случаев передозировки препарата не наблюдалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Особые указания

При беременности и в период грудного вскармливания следует избегать применения на обширных участках.

Не наносить на мокнущие раны.

Избегать попадания препарата в глаза или на слизистые оболочки.

Препарат содержит ланолин, цетостеариловый спирт, которые могут вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит); метилпарагидроксибензоат, который может вызвать аллергические реакции (в том числе, отсроченные).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 5 %.

По 25 г, 30 г, 50 г в тубах алюминиевых с внутренним покрытием защитным лаком с бушонами из полимерных материалов или в тубах из комбинированного материала с бушонами из полимерных материалов.

Каждая туба вместе с инструкцией по медицинскому применению помещена в пачку картонную.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «Зеленая дубрава», Россия,

141801, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 151.

Тел.: +7 (495) 993-99-95.

www.mazi.ru