

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ОКСОЛИН

Регистрационный номер: ЛП-001643

Торговое наименование: Оксолин

Международное непатентованное название или группировочное наименование:
диоксотетрагидрокситетрагидронафталин

Лекарственная форма: мазь назальная

Состав:

Состав на 100 г:

Действующее вещество: диоксотетрагидрокситетрагидронафталин – 0,25 г.

Вспомогательные вещества: парафин жидкий (масло вазелиновое) – 0,50 г, вазелин – 99,25 г.

Описание: мазь светло-желтого цвета. При хранении допускается появление розового оттенка.

Фармакотерапевтическая группа: противовирусное средство для местного применения.

Код АТХ: J05AX

Фармакологическое действие

Препарат обладает вирулицидным действием на вирус гриппа при непосредственном контакте с вируссодержащим материалом, препятствует репродукции вируса в клетках, блокируя места связывания вируса гриппа (преимущественно типа А2) с поверхностью клеточной мембраны.

Фармакокинетика

При нанесении на слизистую оболочку носа всасывается до 20 % препарата.

В организме не кумулирует и выводится в основном почками в течение суток.

Показания к применению

Профилактика гриппа, лечение вирусных ринитов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью

Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до двух лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата в периоды беременности и грудного вскармливания возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Местно. Профилактика гриппа: полоской мази длиной от 3 до 5 мм смазывают ежедневно 2-3 раза в день слизистую оболочку носа в период подъема и максимального развития эпидемической вспышки гриппа (на протяжении 25 дней) или при контакте с больным гриппом. Лечение вирусного ринита: полоской мази длиной от 3 до 5 мм смазывают слизистую оболочку носа 2-3 раза в день в течение 3-4 дней.

Побочное действие

Быстропроходящее чувство жжения слизистой оболочки носа, ринорея. В редких случаях возможно синее окрашивание слизистой оболочки носа.

Передозировка

Случаи передозировки лекарственного препарата не описаны.

Взаимодействие с другими лекарствами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не описано.

Особые указания

Применение препарата не оказывает влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (работа диспетчера, управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Мазь назальная 0,25 %.

По 10, 25 или 30 г в тубы алюминиевые.

Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную упаковку (пачку).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 10 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок хранения

2 года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения: ООО «Озон»

Россия, 445351, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Песочная, д. 11.

Производитель: ООО «Озон»

Россия, Самарская обл., г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6.

Организация, принимающая претензии: ООО «Озон»

Россия, 445351, Самарская обл., г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6.

Тел.: +79874599991, +79874599992

E-mail: ozon@ozon-pharm.ru