

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Касторовое масло

Регистрационный номер: ЛСР-006250/10

Торговое название: Касторовое масло

Международное непатентованное наименование: Клещевины обыкновенной семян масло

Лекарственная форма: масло для приема внутрь

Характеристика

Клещевинное масло. Жирное масло, получаемое из семян культивируемого растения клещевины обыкновенной, семейства молочайные.

Состав.

Касторовое масло.

Описание

Прозрачная, густая и вязкая жидкость от светло-жёлтого до жёлтого цвета со слабым характерным запахом. На воздухе в тонком слое медленно густеет, но не образует плотной или твердой пленки. При охлаждении до $(-16)^{\circ}\text{C}$ застывает в мазеобразную массу.

Фармакотерапевтическая группа: слабительное средство растительного происхождения.

Код АТХ: A06AB05

Фармакологические свойства

При приеме внутрь расщепляется липазой в тонком кишечнике с образованием рицинолевой кислоты, которая вызывает раздражение рецепторов кишечника на всем его протяжении и рефлекторное усиление перистальтики. Слабительный эффект наступает обычно через 5–6 часов. При приеме касторового масла наблюдается также рефлекторное сокращение мускулатуры матки.

Показания к применению

Запоры, подготовка кишечника перед диагностическими процедурами.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, «острый живот».

Нельзя применять в качестве слабительного средства при отравлении жирорастворимыми веществами (фосфором, бензолом и др.) и при лечении глистной инвазии экстрактом мужского папоротника.

Не рекомендуется детям до двух лет.

Применение при беременности и лактации.

Не рекомендуется, так как препарат может приводить к сокращению мускулатуры матки.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым – по 15–30 г (1–2 столовых ложки),

детям: от 2 до 7 лет – по 5 г (чайная ложка) на прием;

от 7 до 12 лет – по 10 г (десертная ложка) на прием;

от 12 до 18 лет – по 15 г (столовая ложка) на прием.

Особые указания

Не следует применять более 3 дней. При длительном приеме возможно развитие атонии кишечника.

Побочное действие

Аллергические реакции, атония кишечника (при длительном приеме).

Форма выпуска

Масло для приема внутрь.

По 30, 40, 50, 100 мл препарата во флаконы светозащитного стекла, укупоренные полиэтиленовыми пробками с крышками навинчиваемыми или навинчиваемыми с контролем первого вскрытия, а также допускается использование крышек без пробки.

На флакон наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящуюся этикетку.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Допускается вложение мерной ложки или мерного стаканчика из полипропилена в каждую пачку.

Допускается текст инструкции по медицинскому применению наносить на картонную пачку.

По 10, 16, 20, 30, 40, 56, 112 флаконов по 30, 40, 50, 100 мл с соответствующим количеством инструкций по медицинскому применению помещают в коробку картонную или ящик из гофрированного картона (для стационаров).

По 0,8 кг в канистры из полиэтилена низкого давления (для производственных отделов аптек).

На канистры наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей, или для документов, или самоклеящуюся этикетку.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от 8 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель и организация, принимающая претензии потребителей

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Тел./факс (8332) 65-46-64, 65-35-10