

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА


НАШАТЫРНО-АНИСОВЫЕ КАПЛИ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Нашатырно-анисовые капли

Международное непатентованное или группировочное наименование:

аммиак + аниса плодов масло



Лекарственная форма: раствор для приема внутрь спиртовой.

Состав на 100 мл:

Действующие вещества: аниса плодов масло - 2,81 г, аммиака раствор 10 % - 15 мл, что эквивалентно содержанию 1,5 г аммиака.

Вспомогательное вещество: этанол (спирт этиловый) 90 % - до 100 мл

Описание: прозрачная, бесцветная или слегка желтоватого цвета жидкость с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: отхаркивающее средство

Код АТХ: R05CA10

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Препарат рефлекторно влияет на бронхи и бронхиальные железы, стимулируя моторную функцию мерцательного эпителия и бронхиол, что способствует продвижению и выведению мокроты из нижних и верхних отделов дыхательных путей. Этот эффект сочетается с усилением секреции бронхиальных желез и некоторым уменьшением вязкости мокроты.

Анисовое масло обладает отхаркивающим действием, обусловленным содержанием в масле анетол, который способствует рефлекторному возбуждению дыхания, повышению активности реснитчатого эпителия дыхательных путей и усилению секреции слизистых оболочек гортани, трахеи, бронхов. Аммиак обладает раздражающим действием, которое

приводит к возбуждению окончаний чувствительных нервов верхних дыхательных путей и рефлекторной стимуляции дыхательного центра.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей (в том числе трахеит, трахеобронхит, бронхит).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, детский возраст до 1 года.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст с 1 года.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь, 2-3 раза в день. Перед применением препарат следует разводить в небольшом количестве воды (1/4-1/2 стакана).

Препарат следует применять только в разведенном виде!

Разовая доза для взрослых составляет 10-15 капель, детям с 1 года назначают на прием столько капель, сколько лет ребенку. Курс лечения составляет 1-2 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача. В период применения препарата рекомендуется обильное теплое питье. Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны кожные аллергические реакции (кожный зуд, кожная сыпь, гиперемия кожных покровов), тошнота, рвота.

Применение препарата в неразведенном виде может вызвать ожоги слизистых оболочек.

Если при применении препарата наблюдаются нежелательные реакции, или Вы заметили побочные эффекты, не указанные в данной инструкции, прекратите применение препарата и обратитесь к врачу.

Передозировка

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендованные, возможно появление тошноты. *Лечение:* симптоматическое.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Препарат следует применять только в разведенном виде! Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата для взрослых составляет 0,18 г, в максимальной суточной дозе – 0,54 г. В одной капле препарата содержится 0,012 г абсолютного этилового спирта.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Раствор для приема внутрь спиртовой.

По 25, 40 мл препарата во флаконы оранжевого стекла, укупоренные полиэтиленовыми пробками с пластмассовыми крышками навинчиваемыми или навинчиваемыми с контролем первого вскрытия, также допускается использование крышек без пробки.

На флаконы наклеивают этикетку из бумаги или самоклеящуюся этикетку.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Допускается вложение полимерной ложки мерной в каждую пачку.

По 10, 16, 20, 30, 40, 56, 112 флаконов по 25, 40 мл с соответствующим количеством инструкций по медицинскому применению помещают в коробку картонную или ящик из гофрированного картона (для стационаров).

Условия хранения

Хранить при температуре от 8 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Тел./факс (8332) 65-46-64, 65-35-10

E-mail: kachestvo-s@k-ff.ru

www.k-ff.ru

Генеральный директор

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»



С.Н. Федотовский

МИНЗДРАВ РОССИИ
117-000124 - 070520
СОГЛАСОВАНО

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

листа(ов)

