

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЦИНДОЛ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Циндол

Международное непатентованное или группировочное наименование: цинка оксид

Лекарственная форма: суспензия для наружного применения

Состав:

на 100 г:

Действующее вещество: цинка оксид – 12,5 г.

Вспомогательные вещества: тальк – 12,5 г; крахмал картофельный – 12,5 г; глицерол – 20,0 г; этанол (спирт этиловый) 70% - 20,0 г; вода очищенная – до 100,0 г.

Описание: неоднородная взвесь с быстро выделяющимся после взбалтывания осадком белого или белого с сероватым оттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа: дерматопротекторное средство

Код АТХ: D02AB

Фармакологические свойства

Антисептическое, вяжущее, подсушивающее средство. При нанесении на пораженную поверхность уменьшает явления экссудации, воспаления и раздражения тканей.

Показания к применению

Дерматиты, язвы кожи, опрелости.

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Министерство Здравоохранения

№ 000513 - 8/95/3

Согласовано

112640

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Возможно применение во время беременности и в период грудного вскармливания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно. Перед применением взбалтывать. Тампоном, смоченным препаратом, наносят суспензию на пораженные участки кожи 2-3 раза в сутки.

Если после лечения улучшение не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие

Возможны местные аллергические реакции: кожный зуд, гиперемия, сыпь.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки при наружном применении не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не изучалось.

Особые указания

Суспензия предназначена только для наружного применения. Не допускать попадания в глаза. Суспензию не следует применять при наличии инфекции в местах поврежденной кожи.

Внимательно прочтите инструкцию перед тем, как начать применение препарата. Сохраните инструкцию, она может понадобиться вновь. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу. Лекарственное средство, которым Вы лечитесь предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами или занятию другими потенциально опасными видами деятельности.

Форма выпуска

Суспензия для наружного применения 12,5 %.

По 50, 100, 125 и 200 г препарата во флаконы светозащитного стекла или полиэтилентерефталата, укупоренные полиэтиленовыми пробками с пластиковыми крышками навинчиваемыми или навинчиваемыми с контролем первого вскрытия, или крышками с аппликатором для нанесения, также допускается использование крышек без пробки.

На флакон наклеивают этикетку из бумаги этикеточной, или писчей, или самоклеящуюся этикетку.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска


Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»
Россия, 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 27 а
Тел./факс (8332) 65-46-64, 65-35-10

Генеральный директор

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»



С.Н. Федотовский

80931912 760000

80-000000-3/0613

0078000000

112640