

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

БОРНАЯ КИСЛОТА

Регистрационный номер: ЛСР-010520/09

Торговое название: Борная кислота

Международное непатентованное или группировочное название: борная кислота

Лекарственная форма: раствор для местного применения спиртовой

Состав на 100 мл:

активное вещество: борная кислота 3 г

вспомогательное вещество: этанол (этиловый спирт) 70 % до 100 мл

Описание: бесцветная прозрачная жидкость с запахом спирта.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептическое средство

Код АТХ: [D08AD]

Фармакологическое действие

Антисептическое средство; коагулирует белки

(в т. ч. ферментные) микробной клетки, нарушает проницаемость клеточной оболочки.

Фармакокинетика

Хорошо проникает через кожу и слизистые оболочки; медленно выводится и может накапливаться в органах и тканях. Выводится почками - 50% (в течение 12 ч), остальное количество - в течение 5-7 дней.

Показания к применению

Отит (острый наружный и хронический) без повреждения барабанной перепонки.

Противопоказания

Гиперчувствительность, хроническая почечная недостаточность, перфорация барабанной перепонки; беременность, детский возраст, период лактации.

Способ применения и дозы

Местно. При остром и хроническом отите по 3-5 кап. наносят на турунду и вводят в наружный слуховой проход

2-3 раза в день. Курс лечения не должен превышать 3-5 дней.

Побочные эффекты

Местные реакции: зуд, жжение, гиперемия кожи наружного слухового прохода.

Аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы острой интоксикации (при случайном приеме внутрь): тошнота, рвота, диарея, гастралгия, нарушение функций сердечно-сосудистой системы, стимуляция или угнетение центральной нервной системы, гиперпирексия, эритематозные высыпания с последующей десквамацией (возможен летальный исход в течение 5-7 дней), нарушение функции почек и печени (в т. ч. желтуха), циркуляторный коллапс, шок, в т. ч. с летальным исходом.

Лечение: симптоматическое. Переливание крови, гемо- и перитонеальный диализ.

Особые указания

Избегать попадания на слизистые оболочки.

Форма выпуска

Раствор для местного применения спиртовой 3%.

По 10, 25, 40 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной или по 10, 15, 25 мл во флаконы-капельницы, укупоренные пробками полиэтиленовыми и навинчиваемыми крышками.

Каждый флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Допускается упаковка флаконов без пачки вместе с равным количеством инструкций по медицинскому применению в групповую упаковку.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

300004, г. Тула, Торховский проезд, дом 10.

Тел/факс 8 (4872) 41-04-73.