

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Д-ПАНТЕНОЛ

Регистрационный номер: ЛП-№(003618)-(РГ-RU)

Торговое наименование: Д-Пантенол

Международное непатентованное или группировочное наименование: декспантенол

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав:

В 100 г мази содержится:

Действующее вещество: декспантенол – 5,00 г.

Вспомогательные вещества: ланолин – 25,00 г; парафин жидкий – 20,00 г; вазелин – 13,00 г; цетостеариловый спирт – 3,00 г; воск пчелиный белый – 3,00 г; метилпарагидроксибензоат – 0,07 г; пропилпарагидроксибензоат – 0,03 г; вода очищенная – 30,90 г.

Описание:

Однородная мазь от белого с желтоватым оттенком до светло-желтого цвета, со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа: препараты для лечения ран и язв; препараты, способствующие нормальному рубцеванию; другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию.

Код АТХ: D03AX03

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Декспантенол – производное пантотеновой кислоты. Декспантенол в клетках кожи преобразуется в пантотеновую кислоту (витамин B5), которая играет важную роль как в формировании, так и в заживлении поврежденных кожных покровов. Декспантенол оказывает регенерирующее и метаболическое действие: стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон.

Фармакокинетика

При местном применении быстро абсорбируется и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулином и альбумином).

Концентрация ее в крови – 0.5-1 мг/л, в сыворотке крови – 100 мкг/л. Пантотеновая кислота не подвергается метаболизму (кроме включения в кофермент А), выводится в неизмененном виде почками.

Показания к применению

При нарушении целостности кожных покровов: заживление ожогов (в т.ч. солнечных), мелких повреждений кожи (ссадины, порезы, трещины и пр.).

Профилактика и лечение сухости кожи, в том числе и как следствие дерматитов различного генеза (проявляющихся шелушением, покраснением, раздражением, чувством стянутости), а также ежедневный уход за участками кожных покровов, подверженных наибольшему воздействию внешних факторов (лицо, руки).

Для ухода за молочной железой в период лактации (трещины и покраснения сосков молочной железы), для ухода за грудными детьми и младенцами (опрелость, «пеленочный» дерматит).

Противопоказания

Применение препарата противопоказано при повышенной чувствительности к декспантенолу и/или к любому вспомогательному веществу в составе препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат можно применять в период беременности и грудного вскармливания. При применении препарата для обработки трещин на сосках во время грудного вскармливания, перед кормлением ребенка мазь необходимо смыть.

Способ применения и дозы

Наружно.

Мазь наносят 2-4 раза в сутки, тонким слоем на пораженный участок кожи, слегка втирая. В случае нанесения на инфицированную поверхность кожи, ее следует предварительно обработать любым антисептиком. Кормящим матерям необходимо смазывать поверхность соска мазью после каждого кормления грудью.

Грудным детям (в т.ч. новорожденным) мазь наносят после каждой смены белья или водной процедуры.

Длительность применения препарата и возможность повторения курса лечения зависят от индивидуальных особенностей течения заболевания у пациента, и определяется достигнутым терапевтическим эффектом и переносимостью препарата.

При отсутствии положительного эффекта от проводимой терапии, ухудшении состояния или появления новых симптомов следует обратиться к врачу. Применяйте препарат только согласно тем показаниям и тому способу применения, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Аллергические реакции, аллергические кожные реакции (например, контактный дерматит, аллергический дерматит, кожный зуд, кожная сыпь, покраснение кожи, экзема, крапивница, раздражение кожи, пузыри на коже).

Если у Вас отмечаются нежелательные реакции, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Особые указания

Не наносить на мокнущие раны. Избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки. При применении декспантенола в период беременности и грудного вскармливания следует избегать нанесения препарата на обширные участки.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 5 %.

По 25, 30, 35 или 50 г в тубы алюминиевые с бушонами.

Одну тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению (листок-вкладыш) помещают в картонную упаковку (пачку).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения: ООО «Атолл»

Россия, 445351, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6.

Производитель: ООО «Озон»

Россия, Самарская обл., г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6.

Организация, принимающая претензии потребителей: ООО «Озон»

Россия, 445351, Самарская обл., г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6.

Тел.: +79874599991, +79874599992

E-mail: ozon@ozon-pharm.ru