

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ВИНИЛИН

(Шостаковского бальзам)

Номер регистрационного удостоверения: ЛП-002178

Торговое наименование: Винилин (Шостаковского бальзам)

Лекарственная форма: бальзам

Состав.

Поливинокс (винилин) – 50 г или 100 г

Описание: густая, вязкая жидкость светло-желтого цвета, специфического запаха. На воздухе не густеет и не высыхает.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство

Код АТХ: [D08AX]

Фармакологическое действие

Обладает противомикробным действием, способствует очищению ран, регенерации тканей и эпителизации. При приеме внутрь действует как обволакивающее, противовоспалительное и бактериостатическое средство.

Показания к применению

Наружно: фурункулы, карбункулы, трофические язвы, гнойные раны, мастит, раны мягких тканей, ожоги и обморожения.

Внутрь: в комплексном лечении эрозивно-язвенных заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки, обострение хронических гастритов с повышенной секреторной функцией желудка.

Противопоказания

Гиперчувствительность.

При приеме препарата внутрь: заболевания печени, желчного пузыря и почек, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы

Наружно: для смачивания салфеток и непосредственного нанесения на раневую поверхность в достаточном количестве.

Внутрь: 1 раз в день через 5-6 часов после последнего приема пищи (рекомендуется легкий ужин в 18 часов и прием препарата в 23-24 часа).

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки: 1 чайная ложка в первый день, в последующие дни – по 1 десертной ложке, курс – 16-20 дней.

При гастритах с повышенной секреторной функцией: 1 чайная ложка в первый день, далее – по 1 десертной ложке через день, курс – 10-12 дней.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Передозировка

Данные о случаях передозировки отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не изучалось.

Форма выпуска. Бальзам.

По 50 г, 100 г препарата во флаконы оранжевого стекла

с винтовой горловиной, укупоренные пробками полимерными и крышками полимерными навинчиваемыми.

По 50 г, 100 г во флаконы из полиэтилентерефталата, укупоренные колпачками полимерными винтовыми.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается укладка флаконов в групповую упаковку

с равным количеством инструкций по применению.

Срок годности

5 лет. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В хорошо укупоренной таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73