

Листок-вкладыш – информация для пациента**Перинева, 2 мг, таблетки****Перинева, 4 мг, таблетки****Перинева, 8 мг, таблетки**

Действующее вещество: периндоприл

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Перинева, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Перинева.
3. Прием препарата Перинева.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Перинева.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Перинева, и для чего его применяют

Лекарственный препарат Перинева содержит в качестве действующего вещества периндоприл, являющийся ингибитором ангиотензинпревращающего фермента. Данный лекарственный препарат сохраняет кровеносные сосуды расширенными, благодаря чему сердце легче прокачивает кровь через них.

Периндоприл принадлежит к классу препаратов, которые называются средствами, действующими на ренин-ангиотензиновую систему, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента. Его действие приводит к расширению кровеносных сосудов, снижению сопротивления периферических артерий, улучшению работы миокарда (сердечной мышцы) и снижению нагрузки на сердце.

Показания к применению

Препарат Перинева применяется у взрослых в возрасте от 18 лет:

- для лечения повышенного артериального давления (артериальной гипертензии);
- для лечения состояния, при котором сердце не может перекачивать достаточное количество крови для удовлетворения потребностей организма (хронической сердечной недостаточности);
- для снижения риска повторного инсульта (при совместном приеме с индапамидом) у пациентов, перенесших инсульт или состояние, связанное с нарушением снабжения мозга кровью, но более легкого по течению, чем инсульт (транзиторное нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу);
- для снижения риска сердечных осложнений у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца (состояние, при котором кровоснабжение сердца снижается или блокируется).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Перинева

Противопоказания

Не принимайте препарат Перинева:

- если у Вас аллергия на периндоприл или другие препараты, относящиеся к ингибиторам ангиотензинпревращающего фермента, или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если ранее при приеме других ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента или при других обстоятельствах у Вас или у одного из кровных родственников развивались такие симптомы, как свистящее дыхание, отек лица, языка или гортани, интенсивный зуд или обильная кожная сыпь (ангионевротический отек);
- если Вы беременны или кормите грудью;
- если у Вас сахарный диабет и (или) нарушение функции почек, и Вы принимаете препарат для снижения артериального давления, содержащий алискирен;
- если у Вас заболевание почек, связанное с сахарным диабетом, и Вы принимаете антагонисты рецепторов ангиотензина II;
- если Вы принимали или в настоящее время принимаете препараты, содержащие валсартан + сакубитрил – препараты для лечения сердечной недостаточности и артериальной гипертензии, так как возрастает риск ангионевротического отека (см. подразделы «Особые указания и меры предосторожности», «Другие препараты и препарат Перинева»);
- если Вам проводится диализ или другой тип фильтрации крови. В зависимости от используемого оборудования препарат Перинева может не подойти для Вашего лечения;
- если у Вас заболевание почек, при котором снижен приток крови к почкам из-за сужения почечных артерий (стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки).

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Перинева проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Обязательно предупредите Вашего лечащего врача, если какой-либо из нижеуказанных пунктов относится к Вам:

- если у Вас сужение главного кровеносного сосуда, ведущего от сердца (стеноз аорты), заболевание сердечной мышцы (гипертрофическая кардиомиопатия) или сужение артерии, снабжающей кровью почки (стеноз почечной артерии);
- если у Вас другие сердечно-сосудистые заболевания;
- если у Вас нарушение функции печени;
- если у Вас заболевание почек или Вам проводится диализ или другой тип фильтрации крови;
- если Вы принимаете аллопуринол (для лечения подагры), цитостатики (для лечения рака) или иммунодепрессанты или получаете терапию прокаинамидом (для лечения нарушений сердечного ритма);
- если у Вас наблюдались серьезные аллергические реакции с отеком лица, губ, рта, языка и горла, которые могли сопровождаться затруднением глотания или дыхания (ангионевротический отек). Это может произойти в любое время в период лечения. Если у Вас возникли такие симптомы, **Вы должны прекратить лечение и немедленно обратиться к врачу;**
- если у Вас наблюдается значительное повышение концентрации гормона альдостерона в крови (первичный гиперальдостеронизм);

- если у Вас системное заболевание соединительной ткани (группа заболеваний, характеризующаяся поражением соединительной ткани), такое как системная красная волчанка или склеродермия;
- если у Вас сахарный диабет;
- если Вы придерживаетесь бессолевой диеты или принимаете пищевые добавки, используете заменители соли, содержащие калий;
- если Вам предстоит серьезная хирургическая операция и (или) анестезия;
- если Вы проходите процедуру удаления холестерина из крови (процедуру афереза липопротеинов низкой плотности);
- если Вы проходите лечение, которое должно дополнительно снизить Вашу чувствительность к аллергическому эффекту укусов пчел или ос (десенсибилизирующая терапия);
- если у Вас недавно наблюдались понос (диарея), рвота или обезвоживание;
- если Вы принимаете какой-либо из нижеперечисленных препаратов для лечения высокого артериального давления:
 - антагонисты рецепторов ангиотензина II (АРА II, также известные как сартаны, например, валсартан, телмисартан, ирбесартан и другие препараты данной группы), особенно если Вы страдаете заболеванием почек, вызванным сахарным диабетом;
 - препараты, содержащие алискирен;
Ваш лечащий врач может регулярно проверять у Вас функцию почек, артериальное давление и содержание электролитов (например, калия) в крови. Смотрите также подраздел «Противопоказания»;
- если Вы принадлежите к негроидной расе, так как Вы можете быть подвержены более высокому риску ангионевротического отека, а также данный препарат может быть менее эффективен в снижении артериального давления в сравнении с пациентами другой расовой принадлежности;
- если Вы принимаете какой-либо из нижеперечисленных препаратов, риск развития ангионевротического отека может быть повышен:
 - рацекадотрил (применяют для лечения диареи);
 - сиролимус, эверолимус, темсиролимус и другие препараты, относящиеся к группе так называемых ингибиторов mTOR (применяют для предотвращения отторжения пересаженных органов и для лечения онкологических заболеваний);
 - сакубитрил (в фиксированной комбинации с валсартаном), применяющийся для лечения хронической сердечной недостаточности;
 - линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин и другие препараты, принадлежащие к классу так называемых глиптинов (применяются для лечения сахарного диабета);
- если у Вас состояние, при котором кровоснабжение сердца снижается или блокируется, что проявляется приступами боли за грудиной (стенокардия);
- если у Вас наблюдается упорный сухой кашель, который может возникать на фоне приема других ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента;
- если Вам была выполнена пересадка (трансплантация) почки.

Ангионевротический отек (аллергическая реакция)

При приеме ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, в том числе препарата Перинева, может наблюдаться тяжелая аллергическая реакция с отеком лица, губ, языка или горла с затруднением глотания или дыхания (ангионевротический отек). Данная реакция может возникнуть в любой момент лечения.

Если у Вас появились данные симптомы, немедленно прекратите прием препарата Перинева и обратитесь к врачу. Смотрите также раздел 4 листка-вкладыша.

Вы должны сказать Вашему врачу, если Вы думаете, что беременны (или планируете забеременеть). Препарат Перинева не должен приниматься во время беременности, так как это может причинить серьезный вред ребенку (смотрите подраздел «Беременность, грудное вскармливание и фертильность»).

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку безопасность и эффективность приема препарата Перинева у детей и подростков не установлены. Препарат Перинева не предназначен для применения у детей и подростков в возрасте до 18 лет.

Другие препараты и препарат Перинева

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. На лечение препаратом Перинева может повлиять прием других препаратов. Ваш лечащий врач может принять решение об изменении дозы препарата и (или) предпринять другие меры предосторожности.

Обязательно сообщите врачу, если Вы принимаете любой из нижеперечисленных препаратов:

- другие препараты для лечения повышенного артериального давления: включая ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, антагонисты рецепторов ангиотензина II, алискирен (см. подразделы «Противопоказания» и «Особые указания и меры предосторожности»), диуретики (препараты, увеличивающие объем мочи, выделяемой почками);
- калийсберегающие мочегонные препараты (такие как триамтерен, амилорид), пищевые добавки с калием или заменители соли, содержащие калий, и другие препараты, которые могут увеличивать содержание калия в организме (такие как гепарин, препарат, который применяется для разжижения крови с целью предотвращения образования тромбов; ко-тримоксазол, также известный как комбинированный препарат, содержащий сульфаметоксазол + триметоприм, который применяется для лечения инфекций, вызванных бактериями);
- препараты лития (для лечения мании и депрессии);
- нестероидные противовоспалительные препараты (например, ибупрофен), ингибиторы циклооксигеназы-2 (например, вальдекоксиб, эторикоксиб) для снятия боли или ацетилсалициловая кислота в высоких дозах (3000 мг в сутки и более), вещество, содержащееся во многих препаратах, которые применяются для облегчения боли и снижения температуры тела, а также с целью предотвращения образования тромбов;
- препараты для лечения сахарного диабета (такие как инсулин, метформин или глиптины (линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин));
- баклофен (для лечения мышечной скованности при таких заболеваниях, как рассеянный склероз);
- препараты для лечения психических нарушений, таких как депрессия, тревога, шизофрения и др. (например, трициклические антидепрессанты, антипсихотические средства);
- иммунодепрессанты (препараты, ослабляющие защитный механизм организма), которые используются для лечения аутоиммунных нарушений или после операции трансплантации для предупреждения отторжения (например, циклоспорин, такролимус);
- триметоприм (для лечения инфекций);
- эстрамустин (для лечения рака);
- препараты, которые наиболее часто применяют для лечения диареи (рацекадотрил) или для профилактики отторжения трансплантированных органов (сиролимус, эверолимус, темсиролимус и другие препараты, принадлежащие к классу так называемых

ингибиторов mTOR) (см. подраздел «Особые указания и меры предосторожности»);

- комбинация валсартан + сакубитрил (для лечения хронической сердечной недостаточности и артериальной гипертензии) (см. подразделы «Противопоказания» и «Особые указания и меры предосторожности»;
- аллопуринол (для лечения подагры);
- прокаинамид (для лечения нерегулярного сердечного ритма);
- сосудорасширяющие препараты, включая нитраты;
- препараты для лечения пониженного артериального давления, шока или бронхиальной астмы (например, эфедрин, норадреналин или адреналин);
- препараты золота для внутривенного введения (для лечения симптомов ревматоидного артрита).

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (таких как периндоприл) во втором и третьем триместрах беременности может привести к нарушениям развития плода (снижение функции почек, маловодие, задержка окостенения черепа, артериальная гипертензия, гиперкалиемия).

Беременность

Не принимайте препарат Перинева во время беременности, так как его прием может нанести серьезный вред здоровью ребенка.

Ваш врач посоветует Вам прекратить прием препарата Перинева до наступления беременности или сразу же, как только Вы узнаете, что беременны. Врач посоветует Вам принимать другой препарат вместо препарата Перинева.

Грудное вскармливание

Не принимайте препарат Перинева, если Вы кормите грудью. Немедленно обратитесь к лечащему врачу и сообщите ему о том, что Вы кормите грудью или планируете кормить грудью.

Фертильность

Не установлено влияния на репродуктивную функцию или фертильность.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Как правило, препарат Перинева не влияет на концентрацию внимания, но у некоторых пациентов из-за пониженного артериального давления может наступить головокружение или слабость. В этом случае способность к управлению транспортными средствами и механизмами может быть снижена.

Препарат Перинева содержит лактозу

Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

3. Прием препарата Перинева

Рекомендуемая доза

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Лечащий врач определит подходящую для Вас дозу препарата.

Артериальная гипертензия

Рекомендуемая начальная доза составляет 4 мг один раз в день.

В случае необходимости через месяц после начала лечения врач может увеличить дозу препарата до 8 мг один раз в день.

Доза 8 мг один раз в день является максимальной рекомендуемой дозой.

Если Вам 65 лет или старше, обычная начальная доза составляет 2 мг в день. После одного месяца лечения врач может увеличить дозу до 4 мг один раз в день, а затем, при необходимости, до 8 мг один раз в день.

Сердечная недостаточность

Рекомендуемая начальная доза составляет 2 мг один раз в день. Через две недели лечения врач может повысить дозу препарата до 4 мг один раз в день, что является максимальной рекомендуемой дозой для лечения сердечной недостаточности.

Профилактика повторного инсульта (совместная терапия с индапамидом)

Рекомендуемая начальная доза составляет 2 мг один раз в день. Через две недели лечения врач может повысить дозу препарата до 4 мг один раз в день до начала приема индапамида.

Ишемическая болезнь сердца

Рекомендуемая начальная доза составляет 4 мг один раз в день. Через две недели врач может увеличить дозу препарата до 8 мг один раз в день.

Если Вам 65 лет или старше, обычная начальная доза составляет 2 мг один раз в день. Через неделю врач может повысить дозу до 4 мг один раз в день, а затем в течение следующей недели увеличить до 8 мг один раз в день.

Путь и (или) способ введения

Принимайте таблетку, запивая стаканом воды, предпочтительно в одно и то же время, утром, перед приемом пищи.

Таблетки 4 мг и 8 мг: линия разлома (риска) не предназначена для разделения таблетки.

Продолжительность терапии

Продолжительность приема препарата устанавливается лечащим врачом. Препарат Перинева принимается длительно.

Если Вы приняли препарата Перинева больше, чем следовало

Если Вы приняли препарата Перинева больше, чем следовало, немедленно обратитесь к врачу или в медицинское учреждение, или службу скорой помощи. Наиболее вероятным эффектом в случае передозировки является понижение артериального давления, из-за чего Вы можете почувствовать головокружение, слабость или потерять сознание. Если Вы почувствовали такие симптомы, лягте на спину и поднимите ноги, это может облегчить Ваше состояние.

Также симптомы, связанные с передозировкой ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента, могут включать циркуляторный шок (кожа может стать холодной и липкой, и Вы можете потерять сознание), нарушения водно-электролитного баланса (изменение содержания солей в организме), почечную недостаточность (нарушение функции почек), гипервентиляцию (учащенное поверхностное дыхание), тахикардию (учащенное сердцебиение), ощущение сердцебиения, брадикардию (замедленное сердцебиение), головокружение, беспокойство и кашель.

Если Вы забыли принять препарат Перинева

Важно принимать препарат каждый день, так как регулярность приема делает лечение более

эффективным. Однако, если Вы забыли принять препарат Перинева, примите следующую дозу в обычное время.

Не принимайте двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили прием препарата Перинева

Поскольку, как правило, лечение повышенного артериального давления проводится в течение всей жизни, не прекращайте принимать препарат Перинева без предварительного обсуждения с лечащим врачом.

При наличии вопросов по приему препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Перинева может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Перинева и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у Вас появится любая серьезная нежелательная реакция из нижеперечисленных

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- сильное головокружение или потеря сознания в связи с низким артериальным давлением (артериальной гипотензией).

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- внезапно развившийся отек лица, губ, языка и горла, затруднение дыхания (ангионевротический отек) (см. раздел 2 листка-вкладыша);
- внезапное свистящее дыхание, боль в груди, одышка или затрудненное дыхание (бронхоспазм).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- загрудинная сердечная боль (стенокардия);
- нарушение ритма сердца (аритмия);
- сердечный приступ (инфаркт миокарда);
- острое нарушение мозгового кровообращения, сопровождающееся мышечной слабостью, нарушением речи, подвижности рук и ног, походки и ориентации в пространстве, онемением лица и лицевой асимметрией (инсульт);
- воспаление поджелудочной железы (панкреатит), которое может вызывать сильную боль в животе и в спине, сопровождающуюся очень плохим самочувствием;
- пожелтение кожи и белков глаз (желтуха), что может быть симптомом воспаления печени (гепатит);
- тяжелое кожное заболевание, характеризующееся мишеневидными высыпаниями синюшно-красного цвета, волдырями и пузырями, с образованием эрозий и корочек и возможным поражением слизистой полости рта, лихорадкой, слабостью и ломотой в теле (многоформная эритема);
- острая почечная недостаточность (острое нарушение функции почек);
- значительное снижение уровня вплоть до отсутствия ряда белых клеток крови (агранулоцитоз);
- дефицит эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов (панцитопения).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Перинева

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головная боль;

- головокружение;
- ощущение вращения, потери равновесия (вертиго);
- спонтанно возникающие ощущения жжения, покалывания, ползания мурашек (парестезия);
- нарушение зрения;
- звон в ушах;
- кашель;
- одышка;
- боль в животе;
- запор;
- частый жидкий стул (диарея);
- расстройство вкуса (дисгевзия);
- нарушение пищеварения (диспепсия);
- тошнота;
- рвота;
- кожный зуд;
- кожная сыпь;
- мышечные спазмы;
- необъяснимая слабость и повышенная утомляемость (астения).

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- депрессия;
- резкие трудно контролируемые перепады настроения (лабильность настроения);
- нарушение сна;
- сонливость;
- потеря сознания (обморок);
- ощущение сердцебиения;
- учащенное сердцебиение (тахикардия);
- воспаление кровеносных сосудов (васкулит);
- сухость во рту;
- высыпания на коже в виде волдырей, сопровождающиеся зудом (крапивница);
- повышенное потоотделение;
- повышенная чувствительность кожи на воздействие солнца (реакция фоточувствительности);
- очаговое образование волдырей на коже (пемфигоид);
- боль в суставах (артралгия);
- боль в мышцах (миалгия);
- нарушение функции почек (почечная недостаточность);
- неспособность мужчины достигнуть или сохранить эрекцию, достаточную для проведения полноценного полового акта (эректильная дисфункция);
- боль в груди;
- общее недомогание;
- отеки ног, например, в области щиколоток (периферические отеки);
- лихорадка;
- падение;
- изменения лабораторных показателей (по результатам анализа крови):
 - повышение содержания эозинофилов (эозинофилия);
 - повышение концентрации калия в крови, обратимое при прекращении лечения (гиперкалиемия);
 - снижение концентрации натрия в крови (гипонатриемия);

- снижение концентрации сахара в крови (гипогликемия);
- повышение концентрации мочевины в крови;
- повышение концентрации креатинина в крови.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- повышение концентрации (потемнение) мочи, тошнота или рвота, мышечные спазмы, спутанность сознания, судороги. Это могут быть симптомы расстройства, которое называется «синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона»;
- внезапное ощущение сильного жара, которое охватывает лицо, шею и верхнюю часть тела, часто сопровождается покраснением кожи, усиленным потоотделением, учащенным сердцебиением и чувством тревоги («приливы»);
- обострение псориаза;
- острая почечная недостаточность;
- состояние, при котором количество выделенной в сутки мочи не превышает 50 мл и отсутствует моча в мочевом пузыре (анурия);
- снижение объема выделенной мочи (олигурия);
- изменение лабораторных показателей (по результатам анализа крови):
 - повышение активности «печеночных» ферментов в крови;
 - повышение концентрации билирубина в крови.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- спутанность сознания;
- аллерго-воспалительное заболевание легких с образованием эозинофильных инфильтратов (эозинофильная пневмония);
- заложенность носа, вызванная воспалением слизистой оболочки полости носа (ринит);
- изменение результатов анализа крови:
 - уменьшение содержания лейкоцитов или нейтрофилов в крови (лейкопения/нейтропения);
 - низкое количество красных клеток крови за счет их повышенного разрушения (гемолитическая анемия) на фоне наследственного заболевания, при котором в крови не хватает важного фермента, помогающего защитить красные клетки крови от разрушения (врожденной недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы);
 - уменьшение количества тромбоцитов в крови (тромбоцитопения)
 - снижение гемоглобина и процентного содержания красных клеток в крови (гематокрита).

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- синдром Рейно, характеризующийся изменением цвета кожи (бледностью, синюшностью, покраснением), онемением и болью в пальцах рук и ног на холоде.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Адрес электронной почты: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://roszdravnadzor.gov.ru>

5. Хранение препарата Перинева

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на пачке картонной после «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

При температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке (блистер) для защиты от влаги.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию (водопровод). Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Перинева содержит

Действующим веществом является периндоприл.

Перинева, 2 мг, таблетки

Каждая таблетка содержит 2 мг периндоприла эрбумина.

Перинева, 4 мг, таблетки

Каждая таблетка содержит 4 мг периндоприла эрбумина.

Перинева, 8 мг, таблетки

Каждая таблетка содержит 8 мг периндоприла эрбумина.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: кальция хлорид гексагидрат, лактозы моногидрат, кросповидон, целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат.

Внешний вид препарата Перинева и содержимое упаковки

Таблетки.

Перинева, 2 мг, таблетки

Круглые, слегка двояковыпуклые таблетки белого или почти белого цвета, с фаской.

Перинева, 4 мг, таблетки

Овальные, слегка двояковыпуклые таблетки белого или почти белого цвета, с фаской, с риской на одной стороне.

Линия разлома (риска) не предназначена для разделения таблетки.

Перинева, 8 мг, таблетки

Круглые, слегка двояковыпуклые таблетки белого или почти белого цвета, с фаской, с риской на одной стороне.

Линия разлома (риска) не предназначена для разделения таблетки.

По 10, 14 или 30 таблеток в блистере из комбинированного материала ориентированного полиамида/алюминия/поливинилхлорида (ОПА/Ал/ПВХ) и фольги алюминиевой.

По 3, 6, 9 блистеров по 10 таблеток, или 1, 2, 4, 7 блистеров по 14 таблеток, или 1, 2, 3 блистера по 30 таблеток вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска «по рецепту».

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация
ООО «КРКА-РУС»
143500, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50
Телефон: +7 (495) 994 70 70
Факс: +7 (495) 994 70 78
Адрес электронной почты: krka-rus@krka.biz

Производитель

Таблетки 2 мг, 4 мг, 8 мг

Словения / Slovenia

АО «КРКА, д.д., Ново место» / KRKA, d.d., Novo mesto

Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место / Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto

Таблетки 4 мг, 8 мг

Российская Федерация

ООО «КРКА-РУС»

143500, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения

Российская Федерация
ООО «КРКА-РУС»
143500, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50
Телефон: +7 (495) 994 70 70
Факс: +7 (495) 994 70 78
Адрес электронной почты: krka-rus@krka.biz

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств.

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) <https://grls.rosminzdrav.ru>
(https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).