

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

СЕПТИЛИН® ПЛЮС

Регистрационный номер: ЛП-001295

Торговое название препарата: СЕПТИЛИН® ПЛЮС

Международное непатентованное или группировочное наименование

Лекарственная форма

Таблетки

Состав

Каждая таблетка содержит:

Активные компоненты:	
Порошки:	
Коммифора мукул (смесь масла, камеди и смолы)	324,0 мг
Шанкх бхасма (зола)	64,0 мг
Экстракт сухой из сбора растительного сырья* :	368,0 мг
Махараснади кват** (многокомпонентная растительная смесь)	35 %
тиноспоры сердцелистной стеблей	27 %
марены сердцелистной корней	17 %
эмблики лекарственной плодов	9 %
моринги крылатосеменной листьев	9 %
солодки голой корней	3 %
Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая 57,0 мг; кросповидон 43,0 мг; кармеллоза натрия 11,0 мг; кремния диоксид коллоидный 5,0 мг; магния стеарат 3,0 мг.	

Примечания:

*В качестве экстрагента для приготовления экстракта из сбора растительного сырья используется вода. Соотношение (сбор: экстракт сухой – 5:1).

**В состав многокомпонентной растительной смеси «Махараснади кват» входят: терминалии чебули околоплодники - *Terminalia chebula* Retz. (Combretaceae); терминалии беллерики околоплодники - *Terminalia bellerica* L. (Combretaceae); эмблики лекарственной плоды - *Emblica officinalis* Gaertn. (Euphorbiaceae); фагонии критской целое растение -

Fagonia cretica L. (Zygophyllaceae); сиды сердцелистной целое растение - *Sida cordifolia* L. (Malvaceae); клещевины обыкновенной целое растение - *Ricinus communis* L. (Euphorbiaceae); кедра гималайского древесина - *Cedrus deodara* (Roxb.ex Lamb.) G.Don (Pinaceae); гедихия колоскового корневища - *Hedychium spicatum* Ham.ex.Sm. (Zingiberaceae); адатоды настоящей корни - *Adhatoda vasica* Nees. (Acanthaceae); имбиря лекарственного корневища - *Zingiber officinale* Roscoe (Zingiberaceae); перца явского длинного стебли - *Piper chaba* L. (Piperaceae); сыти круглой корневища - *Cyperus rotundus* L. (Cyperaceae); берхавии раскидистой корни - *Boerhaavia diffusa* L. (Nyctaginaceae); тиноспоры сердцелистной стебли - *Tinospora cordifolia* Miers. (Menispermaceae); ипомеи пальчатой корни - *Ipomoea digitata* L. (Convolvulaceae); укропа индийского плоды - *Anethum sowa* Roxb. ex Flem. (Apiaceae); якорцев стелющихся плоды - *Tribulus terrestris* L. (Zygophyllaceae);

витании снотворной корня - *Withania somnifera* L. Dunal. (Solanaceae); кассии дудчатой мякоть плода - *Cassia fistula* L. (Fabaceae); спаржи кистевидной корневые клубни - *Asparagus racemosus* Willd. (Liliaceae); перца длинного плоды - *Piper longum* L. (Piperaceae); барлерии пильчатой целое растение - *Barleria prionitis* L. (Acanthaceae); кориандра посевного целое растение - *Coriandrum sativum* L. (Apiaceae); паслена желтоплодного целое растение - *Solanum xanthocarpum* Schrad. et Wendl. (Solanaceae); паслена индийского целое растение - *Solanum indicum* L. (Solanaceae).

Названия производящих растений (в составе активных компонентов) на латинском языке:

Тиноспора сердцелистная – *Tinospora cordifolia* Miers. (Menispermaceae); марена сердцелистная - *Rubia cordifolia* L. (Menyanthaceae); эмблика лекарственная – *Embllica officinalis* Gaertn. (Euphorbiaceae); моринга крылатосеменная – *Moringa pterygosperma* Gaertn. (Moringaceae), солодка голая – *Glycyrrhiza glabra* L. (Fabaceae).

Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки без оболочки зеленовато-коричневого цвета с вкраплениями более светлого и более темного цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Растительного происхождения средство.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

СЕПТИЛИН® ПЛЮС обладает противовоспалительным действием. Входящие в состав препарата действующие активные вещества растений (биофлавоноиды и дубильные вещества) способствуют уменьшению проявлений воспалительного процесса, снижают проницаемость капилляров, проявляют антиэкссудативное действие. Наличие полисахаридов в составе препарата способствует стимуляции фагоцитоза, за счет повышения фагоцитарной активности гранулоцитов и макрофагов, и ускорению хемотаксиса полиморфно-ядерных лейкоцитов в очаге инфекции. Препарат СЕПТИЛИН® ПЛЮС усиливает гуморальный иммунный ответ, способствует повышению неспецифической резистентности организма. Применение препарата способствует купированию клинических признаков острого воспаления верхних дыхательных путей. Препарат оказывает противовоспалительный эффект одновременно на слизистую оболочку носоглотки, глотки и небных миндалин.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике многокомпонентного растительного препарата СЕПТИЛИН® ПЛЮС в лекарственной форме таблетки отсутствуют. Активность препарата обусловлена взаимно усиливающим сочетанным действием его компонентов, что характерно для растительных лекарственных средств. Поскольку активность препарата нельзя полностью отнести за счет какого-либо одного соединения, фармакокинетические исследования многокомпонентных растительных препаратов, в том числе СЕПТИЛИН® ПЛЮС, неосуществимы.

Показания к применению

Риносинусит (острый, обострение хронического).

Обострение хронического тонзиллофарингита.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Возраст до 18 лет.

С осторожностью применять у пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано. При необходимости применения в период грудного вскармливания, грудное вскармливание рекомендуется прекратить.

Способ применения и дозы

Внутрь. По 2 таблетки 2 раза в день в течение 10-14 дней. В случае неполного купирования симптомов заболевания, лечение может быть продолжено до 4 недель в дозе по 1 таблетке 2 раза в день или по усмотрению врача.

В случае появления нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта доза препарата может быть снижена до 1 таблетки 2 раза в день. В случае, если снижение дозы не приводит к купированию симптомов, рекомендуется отмена препарата.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, ощущение сухости во рту, диспепсические явления (тошнота, диарея, метеоризм), абдоминальные боли, транзиторное повышение активности «печеночных» трансаминаз.

При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка

Данные о передозировке отсутствуют. В случае передозировки применяется симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Применение препарата не исключает возможность применения других лекарственных средств, в том числе антибактериальных препаратов.

Особые указания

При прекращении приема препарата СЕПТИЛИН® ПЛЮС в лекарственной форме таблетки о возникновении синдрома «отмены» не сообщалось. Специальных мер при пропуске одной или нескольких доз препарата не требуется. В случае, если пациент один или несколько раз пропускает прием лекарственного средства, следует продолжать прием препарата по рекомендованной в инструкции схеме, не удваивая дозы.

Специальных мер предосторожности при уничтожении неиспользованного лекарственного средства не требуется.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Таблетки. По 60 таблеток в пластиковый флакон из полиэтилена высокой плотности с навинчиваемой крышкой. Горлышко флакона дополнительно затянуто алюминиевой фольгой с

нанесенным на нее товарным знаком фирмы. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения

В сухом месте при температуре от 15 °С до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать позже срока годности.

Условия отпуска

По рецепту.

Производитель

“Хималайя Драг Ко.”, Макали, Бангалор 562 123, Индия.

Адрес места производства: “Хималайя Драг Ко.”, Макали, Бангалор 562 123, Индия.

Эксклюзивный дистрибьютор/организация, принимающая претензии потребителей
ЗАО «ТРАНСАТЛАНТИК ИНТЕРНЕЙШНЛ», Россия, 119590, Москва,
ул. Улофа Пальме, 1. Тел.: (495) 775-39-38, факс: (495) 514-10-54/67.