

Листок-вкладыш – информация для пациента

Троксерутин Альфактив, 2 %, гель для наружного применения

Действующее вещество: троксерутин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуются прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Троксерутин Альфактив и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Троксерутин Альфактив.
3. Применение препарата Троксерутин Альфактив.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Троксерутин Альфактив.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Троксерутин Альфактив и для чего его применяют

Препарат Троксерутин Альфактив содержит действующее вещество троксерутин и относится к ангиопротекторам (препараты, улучшающие микроциркуляцию крови), капилляростабилизирующим средствам (улучшающие состояние сосудов), биофлавоноидам (растительные вещества, которые уменьшают ломкость сосудов, снижают свертываемость крови).

Троксерутин оказывает противовоспалительное действие, повышает тонус венозной стенки, уменьшает отечность тканей.

Показания к применению

Препарат Троксерутин Альфактив применяется у взрослых в возрасте от 18 лет при:

- варикозном расширении вен;
- хронической венозной недостаточности с такими проявлениями, как отеки, боли, ощущение тяжести в ногах;
- поверхностном тромбофлебите, перифлебите, флеботромбозе;
- посттромботическом синдроме;
- посттравматическом отеке, гематоме;
- профилактике осложнений после операций на венах.

Способ действия препарата Троксерутин Альфактив

Троксерутин участвует в окислительно-восстановительных процессах, блокирует фермент, расщепляющий гиалуроновую кислоту, уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, повышает их тонус. Увеличивает плотность сосудистой стенки. Снижает воспаление в сосудистой стенке, ограничивая прилипание (адгезию) тромбоцитов к ее поверхности.

Если улучшение не наступило через 6-7 дней или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Троксерутин Альфактив

Противопоказания

Не применяйте препарат Троксерутин Альфактив:

- если у Вас аллергия на троксерутин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас нарушена целостность кожных покровов;
- если у Вас I триместр беременности;
- если Вы кормите грудью;
- у детей от 0 до 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Троксерутин Альфактив проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Наносите гель только на неповрежденную кожу. Избегайте попадания геля на открытые раны, слизистые оболочки и в глаза! После нанесения препарата вымойте руки.

При состояниях, характеризующихся повышенной проницаемостью сосудов (в том числе

при скарлатине, гриппе, кори, аллергических реакциях), применяйте в сочетании с аскорбиновой кислотой для усиления ее эффекта.

Вам не следует превышать максимальные сроки и рекомендованные дозы при самостоятельном применении препарата. В случае отсутствия уменьшения или при утяжелении симптомов заболевания следует обратиться к врачу.

Применяйте препарат Троксерутин Альфактив с осторожностью, если у Вас почечная недостаточность (при длительном использовании).

Дети и подростки

Препарат Троксерутин Альфактив не предназначен для применения у детей до 18 лет. Безопасность и эффективность препарата у детей в возрасте от 0 до 18 лет не установлены.

Другие препараты и препарат Троксерутин Альфактив

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие лекарственные препараты.

Данные по взаимодействию с другими лекарственными препаратами отсутствуют.

Беременность, грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Не применяйте препарат Троксерутин Альфактив во время беременности.

Грудное вскармливание

Не кормите ребенка грудью во время применения препарата.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Троксерутин Альфактив не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Троксерутин Альфактив содержит бензалкония хлорид

Бензалкония хлорид - раздражитель, может вызывать кожные реакции.

3. Применение препарата Троксерутин Альфактив

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем

или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Доза препарата зависит от площади пораженной поверхности, но не должна превышать 3-4 см геля (1,5-2 г). Наносите гель два раза в день - утром и вечером.

Путь и/или способ введения

Применяйте гель наружно.

Наносите гель на область поражения с помощью легких массирующих движений снизу вверх до его полного впитывания в кожу.

При необходимости гель можно наносить под окклюзионную повязку.

Продолжительность терапии

Обычно длительность применения составляет от 2 недель до 1-2 месяцев. При возобновлении заболевания, Вы можете повторять курс лечения 2-3 раза в год.

Если Вы применили препарата Троксерутин Альфактив больше, чем следовало

Случаи передозировки при местном применении не описаны.

При случайном проглатывании препарата возможны ощущения жжения в полости рта, слюнотечение, тошнота, рвота. В этом случае показано промывание ротовой полости, желудка.

Если Вы забыли применить препарат Троксерутин Альфактив

Не наносите двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если по каким-либо причинам использование препарата было пропущено, Вы можете нанести его в любое время, соблюдая интервал между сеансами лечения не менее 10-12 часов.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Троксерутин Альфактив может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

В редких случаях наблюдаются аллергические реакции:

- покраснение кожных покровов, зуд, сыпь;

- воспаление кожи, сопровождающееся зудом, покраснением и высыпаниями (экзема);
- воспаление кожи после контакта с раздражающим веществом (дерматит);
- зудящие высыпания на коже (крапивница).

Эти симптомы быстро проходят после прекращения лечения.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас при применении препарата Троксеутин Альфактив возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о возникновении нежелательных реакций напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 (800) 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<https://www.roszdravnadzor.gov.ru/>

5. Хранение препарата Троксеутин Альфактив

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на тубе и картонной упаковке (пачке).

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

После вскрытия - 3 года.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Троксеутин Альфактив содержит

Действующим веществом является троксерутин.

100 г геля содержат 2 г троксерутина.

Вспомогательными веществами являются: троламин, карбомер, бензалкония хлорид, динатрия эдетата дигидрат, вода очищенная.

Препарат Троксеутин Альфактив содержит бензалкония хлорид (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Троксеутин Альфактив и содержимое упаковки

Гель для наружного применения.

Однородный прозрачный гель от желтого до зеленовато-желтого цвета, без запаха.

По 20, 30, 40, 50 или 100 г в тубу алюминиевую с полимерным бушоном.

Одну тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению (листок-вкладыш) помещают в картонную упаковку (пачку).

Держатель регистрационного удостоверения

Россия

ООО «РИФ»

445351, Самарская область, г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6, помещ. 272.

Производитель

Россия

ООО «Озон»

Самарская обл., г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6.

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения

Россия

ООО «Озон»

445351, Самарская обл., г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6.

Тел.: +79874599991, +79874599992

E-mail: ozon@ozon-pharm.ru

Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза <https://eec.eaeunion.org/>.