

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Зубные капли

Номер регистрационного удостоверения: ЛП-002156

Торговое наименование: Зубные капли

Международное непатентованное или группировочное наименование: валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка+камфора+мяты перечной листьев масло

Лекарственная форма: капли зубные

Состав.

Мяты перечной масло - 3,1 г

Камфора синтетическая - 6,4 г

Валерианы настойка - до 100 мл

Описание: прозрачная жидкость красновато-коричневого цвета, ароматного запаха.

Фармакотерапевтическая группа: местнораздражающее средство

Код АТХ: A01AD11

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат. Оказывает местнораздражающее (отвлекающее), умеренное обезболивающее, антисептическое, противовоспалительное и успокаивающее действие.

Показания к применению

Зубная боль (до оказания стоматологической врачебной помощи).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 12 лет.

С осторожностью

Детский возраст старше 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение лекарственного препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Местно. Ватный тампон, смоченный 2-3 каплями препарата, прикладывают к больному зубу на 5-10 минут.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При попадании на слизистую оболочку рта лекарственный препарат может вызвать ощущение жжения.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При правильном применении лекарственного препарата (местно) передозировка маловероятна; при случайном приеме лекарственного препарата внутрь возможно появление симптомов раздражения желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота) и сонливости.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не описано.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения лекарственным препаратом необходимо соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Капли зубные.

По 10, 15, 25 мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла с винтовой горловиной, закупоренные пробками-капельницами и навинчиваемыми пластмассовыми крышками.

Каждый флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается упаковка флаконов-капельниц вместе с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 42-04-73